

Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*) en Castilla-La Mancha



FICHA TÉCNICA

Nombre común: Águila Imperial Ibérica.
 Nombre científico: *Aquila adalberti* Brehm, 1861.
 Orden: Falconiformes.
 Longitud: 72-85 cm.
 Envergadura: 190-210 cm.
 Peso: 2.500-4.000 g.
 Población española: aproximadamente 200 parejas.
 Población en Castilla-La Mancha: 60 parejas.
 Áreas críticas para la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha:

- Ríos de la Cuenca Media del Guadiana (Cr)
- Sierra Morena (Cr)
- Valle del Alberche (To)
- Valle del Tíetar (To)
- Cerros de Noz y Layos (To)
- Montes de Toledo (Cr y To)


Status: especie autóctona y sedentaria con dispersiones juveniles. Hasta fecha reciente se ha considerado como subespecie del Águila Imperial (oriental) con el nombre de Águila heliaca (*adalberti*).
 Alimentación: fundamentalmente conejos (*Oryctolagus cuniculus*). También presas de tamaño medio como liebre, aves acuáticas, corvidos, palomas y carroña.
 Hábitat: especie característica de ecosistemas mediterráneos, llanuras, piedemonte y media montaña. Siempre alejada del hombre.
 Estado de conservación: especie amenazada en peligro de extinción, aunque con población en ligero crecimiento.
 Amenazas: mortalidad no natural como consecuencia de electrocuciones, envenenamiento y caza furtiva. Alteración del hábitat y disminución de presas básicas.

Plan de Recuperación: pretende garantizar la conservación de sus poblaciones y su hábitat natural. Presenta las siguientes acciones:

- Eliminar las causas de mortalidad no natural: electrocuciones e intoxicaciones por cebos envenenados.
- Conservación de su hábitat en condiciones favorables.
- Eliminación de molestias en las áreas de reproducción y en las de dispersión juvenil.
- Mejora de las poblaciones de sus presas, con especial atención a la recuperación del conejo, su presa básica.
- Seguimiento permanente de la población.
- Asegurar la recogida y reintroducción de ejemplares heridos o accidentados.
- Labores de divulgación y sensibilización.
- Desarrollo de un Programa de Cría en Cautividad de la especie.



ESQUEMA DE LA REPRODUCCION



NOTAS

1. Plumaje juvenil
2. Plumaje del 1º invierno y 2º año
3. Plumaje con 2-3 años
4. Plumaje con 3 años (damero)
5. Plumaje con 3-4 años
6. Plumaje con 4 años
7. Plumaje con 5 años (adulto imperfecto)
8. Plumaje a partir del 5º año (adulto)
9. Individuo adulto de Águila Imperial (*Aquila heliaca*)
10. Joven volantón de Águila Imperial (*Aquila heliaca*)
11. Conejo (*Oryctolagus cuniculus*)

La sucesión de plumajes varía considerablemente de unos individuos a otros.